Suchttherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Indikationen, multimodales Vorgehen und Vernetzung

Suchttagung Innsbruck, 30.09.2016

Dr. med. Moritz Noack

RUB

LWL-Universitätsklinik Hamm
der Ruhr-Universität Bochum
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychotherapie & Psychosomatik

LWL

Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe.

Hamm in Westfalen

DHS
Deutsche Hauptstelle
für Suchtfragen e.V.

Kleines suchtmedizinisches Glossar der stationären Suchttherapie

Akuttherapie:

- Entgiftungen
sind abzugrenzen von
- Qualifizierten Entzugsbehandlungen

Subakut-(Postakut-)therapie:

- Behandlung komorbider psychiatrischer Störungen
 - » Psychiatrische Abteilungen
- Rehabilitationsbehandlung (Entwöhnung, Langzeittherapie)
 - » Spezialisierte Fachkliniken
- Therapeutische Wohngruppen (stationäre Nachsorge)
 - » Jugendhilfeeinrichtungen

Suchttherapie in der LWL-Universitätsklinik Hamm

Integrierte Behandlung
Suchtambulanz
Qualifizierter Entzug (3 Wochen)
„Drogen-Plus“ Konzept (2 Monate)
Stationäre Rehabilitation (6 Monate)

www.drug-out.lwl.org

Suchtbehandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

- Mit Suchterkrankungen zu arbeiten ist integraler Bestandteil des Faches Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Änderungen in den deutschen Psychotherapierichtlinien 2011:
 - Eine ambulante Psychotherapie ist zulässig, wenn bis zum Ende von maximal zehn Behandlungsstunden die Abstinenz erreicht werden kann.
 - Für opiatabhängige Menschen, die substituiert werden und keinen Beigebrauch von Suchtmitteln haben, ist eine ambulante Psychotherapie in enger Zusammenarbeit mit den substituierenden Ärzten möglich
- „Allerdings übernimmt zumindest die stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie höchst ungern diese Aufgabe und verweist solche Patienten in der Regel an auf Suchterkrankungen spezialisierte Einrichtungen...“ (aus Handbuch der Suchtbehandlung, Fengler S. 273)

143 KJP-Kliniken deutschlandweit – 20 Abteilungen bieten eine spezielle Suchtbehandlung an

Österreich

The screenshot shows the homepage of the 'Österreichischer Suchthilfekompass' (Austrian Drug Assistance Compass). At the top, there is a navigation bar with links for 'Start', 'Sitemap', 'Kontakt', 'Impressum', 'Gesetzlicher Rahmen', 'Themenwand Links', and 'Hilfe'. The logo for 'Gesundheit Österreich GmbH' is in the top left. The main heading is 'Österreichischer Suchthilfekompass', with sub-links for 'ambulante Einrichtungen' and 'stationäre Einrichtungen'. The main content area features a compass graphic and text explaining the service: it is an electronic directory of drug assistance facilities developed by the Austrian Health Insurance Company (GÖG) in cooperation with the Federal Ministry of Health (BMG). It provides information on facilities according to § 15 of the Narcotics Act, including ambulatory and stationary services. Search functions are available to find specific facilities, with options for full-text search or filters. Contact information for Elisabeth Türscherl (EDV-technical questions) and Sabine Schabetsberger (factual questions) is provided at the bottom.

- Abfrage am 26.09.2016:
- Stationärer Entzug / Stationäre Therapie auch für Jugendliche in 5 bzw. 8 Abteilungen in Österreich (davon 1 Klinik für KJP)

Spezialisierte (Sucht-) Behandlung vs. KJP-Regelversorgung

Vorteile Spezialisierung

- Fokus auf Suchtproblematik
- Spezialisierte Fachkräfte
- Schutz / Begrenzung
- Motivationsarbeit in der Gruppe

Nachteile Spezialisierung

- „Institutionelle“ Zuschreibung einer Suchtproblematik wird gefördert
- Einbezug von Familie und Helfersystem erschwert

Vorteile Regelversorgung

- Wohnortnähe
- Familieneinbezug
- Vernetzung mit Helfersystem

Nachteile Regelversorgung

- Patientenzahlen oft zu gering für spezielle Gruppenangebote
- Überforderung im Umgang mit dem Thema Sucht in der Therapie

Anforderungen an die qualifizierte Entzugsbehandlung bei Kindern und Jugendlichen

Rainer Thomasius¹, Edelhard Thoms², Peter Melchers³, Gotthard Roosen-Runge⁴, Gisela Schimansky⁴, Oliver Bilke-Hentsch⁵ und Olaf Reis⁶

¹Zentrum für Psychosoziale Medizin – Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters Hamburg, Deutschland

²Parkkrankenhaus Leipzig Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik, Leipzig, Deutschland

³Kinder- u. Jugendpsychiatrie Klinikum Oberberg, Klinik Marienheide und KKH Gummersbach, Deutschland

⁴Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Deutschland

⁵Modellstation Somosa Winterthur, Schweiz

⁶Universität Rostock Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter, Rostock, Deutschland

Schlussfolgerung:

Die Durchführung von Entzugsmaßnahmen bei Minderjährigen soll kinder- und jugendpsychiatrische und –psychotherapeutische Standards erfüllen. Die Behandlung suchtkranker Kinder- und Jugendlicher sollte nicht gemeinsam mit Patienten erfolgen, die wegen anderer psychiatrischer Störungen aufgenommen werden.

Anforderungen an die qualifizierte Entzugsbehandlung bei Kindern und Jugendlichen

- Pädagogisch angeleitete Tages- und Freizeitstrukturierung
- Herstellung von Suchtmittelabstinenz
- Bearbeitung familiärer, schulischer und sozialer Problemlagen
- Diagnostik hinsichtlich psychiatrisch komorbider Störungen
- Reintegration in Schule und Ausbildung
- Perspektivklärung und Weitervermittlung
- Unterschiedliche Dauer 4 – 12 Wochen

Quelle:

<http://dgkjp.de/images/files/stellungnahmen/2013/stn-2012-04-13-QE%20bei%20Kindern%20und%20Jugendlichen-dgkjp-bag-bkjpp.pdf>

www.kinderpsychiater.org

www.dgkjp.de

Stellungnahme der Gemeinsamen Suchtkommission der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP), Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BAG) Berufsverband der Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BKJPP)

Anforderungen an die qualifizierte Entzugsbehandlung bei Kindern und Jugendlichen

Begriffsklärung

Die qualifizierte Entzugsbehandlung zielt neben der Bewältigung von Entzugssymptomen auf das Erreichen von Krankheitseinsicht, die Vermittlung erster Strategien für den Umgang mit dem gefährlichen Substanzgebrauch oder der Abhängigkeitserkrankung, die Motivierung zur Inanspruchnahme

Logo of bag_kjpp and dgkjp. Text: Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BAG) Berufsverband der Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BKJPP) Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) Dr. med. Math. Hertenstein

Suchttherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Suchterkrankung + viele andere Themen

Pubertät – (Pseudo)autonomie – Entwicklungsverzögerungen – Emotionale
Stimmungsschwankungen - Aggressionen – Fehlende Regel- und
Grenzakzeptanz – Misstrauen – Belastete Familiensituationen - Schul- und
Ausbildungsabbrüche – Kriminalitätsentwicklung

Suchttherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Suchterkrankung + psychiatrische Komorbiditäten

Psychische Störung als Komorbidität bei 60 % (Stolle et. al., 2009)

Störungen des Sozialverhaltens - Hyperkinetische Störungen (ADHS) -
Affektive (uni-/bipolare) Störungen - Belastungsstörungen –
Angststörungen - Sozialphobische Störungen –
Persönlichkeitsentwicklungsstörungen- Essstörungen -
Substanzinduzierte Psychosen - Schizophrene Psychosen

Indikationen für eine stationäre Suchtbehandlung

Grundvoraussetzung für eine stationäre qualifizierte Entzugsbehandlung

- Vorliegen einer manifesten Abhängigkeitserkrankung

Weitere Voraussetzungen

- Gescheiterte ambulante Entzugsversuche
- Vorliegen einer schweren psychiatrischen Komorbidität
- Hohe psychosoziale Unreife (fehlende Tagesstruktur, etc.)
- Fehlen sozialer Hilfestrukturen durch Desintegration
- Vorhandensein hoher Konsumhäufigkeiten
- Auftreten eines schweren Entzugssyndroms
- Frühzeitige Interventionen bei Minderjährigen empfohlen

Sucht-Hauptdiagnosen auf der qualifizierten Entzugsstation Hamm 2015

- Cannabis
- Amphetamine
- Alkohol
- Heroin
- Polytoxikomanie

Zusätzlich hoher Mischkonsum von anderen Drogen

Besonderheiten der Suchttherapie in der KJP

- » Auftragsklärung
- » Einschränkungen der Autonomie
- » Umgang mit Regeln

Stationäre Suchtbehandlung - Trainingslager für einen Alltag ohne Drogen...

Stationäre Suchtbehandlung - Trainingslager für einen legalen Alltag...

Gemeinsame Vereinbarung zur Behandlung

Therapievertrag

zur Behandlung auf der
Station A10 - Qualifizierte Entzugsbehandlung

der

LWL Universitätsklinik Hamm
Der Ruhr-Universität Bochum

Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik

Zwischen

_____ (Name des Jugendlichen)

und der

LWL Universitätsklinik Hamm

vertreten durch

_____ (zuständige/r Therapeut/in)

und

_____ (zuständige Bezugsperson des PED)

Multimodales Vorgehen

Begleitung durch den Pflege- und Erziehungsdienst (Bezugspflege)

„Ich bin das nicht gewohnt... wenn Erwachsene zuletzt freundlich zu mir waren – wollten die mir Drogen verkaufen oder Sex haben...“

(Nina, 15 Jahre)

(Max Frisch)

„Man sollte dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten,
dass er hineinschlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen
Lappen um die Ohren schlagen.“

Ohrakupunktur nach dem NADA-Protokoll

Freizeit- und Kulturprogramm

Somatische Behandlung

Medizinische Eingangsdiagnostik:

- Körperliche Untersuchung, Allgemeinzustand
- Medizinische Vorgeschichte
- Untersuchung auf Infektionen, Skabies, Läuse

Begleitung der Entzugssymptomatik:

- Intoxikationsbehandlung
- Pharmakologische Entzugsbehandlung
 - spezifisch: Alkohol, Benzodiazepine, Opiate
 - unspezifisch: Symptombehandlung beim Entzug anderer Drogen
- Viele Jugendliche können auch ohne Medikation einen Entzug bestehen (fester Plan für alle vs. symptomorientierte Medikation?)
- Behandlung der psychiatrischen / medizinischen Komorbidität

Psychotherapie-Einzelsetting

Psychotherapie - Einzelsetting

- Psychoedukation
- Motivational Interviewing
- Kognitive Therapie
- Psychodynamisch orientierte Therapie
- Multisystemische Therapie

Wunsch und Wirklichkeit

Zeichnung: Mohr, 1990

Batra, Bilke-Hentsch
Praxisbuch Sucht,
2. Auflage Thieme, 2016

Psychotherapie - Gruppensetting

- **Wissensvermittlung** (Psychoedukation)
- **Motivation** (Herstellen einer Veränderungsbereitschaft)
- **Vermittlung von Fertigkeiten** (Handwerkszeug) zur Abstinenz
- **Soziales Lernen in der Gruppe**
- **Selbsterfahrung** (Umgang mit Gefühlen)
- **Substanzspezifische Gruppentherapie** (z.B. CANDIS)

Familientherapeutische Interventionen – Familiengespräche und Familienseminar

Die erfolgreiche Einbeziehung von Eltern bzw. deren eigene Therapie verbessern die Behandlungsprognose (Morgenroth, 2010)

Ziele der Familientherapie:

Klärung der familiären Rollen (-zuschreibungen)
Kränkungen und Verletzungen ansprechen
Transparenz der Gefühle und damit eine
Linderung des Leides (bei beiden Parteien) bewirken
Positive Veränderungen in der Therapie herausarbeiten
Zukünftige Erwartungen – Absprachen finden

„Wenn die Familie gut funktionieren soll, dann müssen Eltern und Kinder die Tatsache akzeptieren, dass der differenzierte Einsatz von Autorität für das elterliche Subsystem notwendig ist...“

(Minuchin, Familie und Familientherapie, 1984)

Arbeitstherapie und Klinikschule

- Arbeitstrainingswerkstatt

- Klinikschule

Sozialdienst

Psychomotorik

Theaterpädagogik und -therapie

Adventliche Werkstattpräsentation des
Theaterprojekts der Stationen B1/B2:

warm uns Herz?

Mr. Scrooge läßt sich beGeistern

Dienstag, **15.12.2015**, 16:30 Uhr
Aula der LWL-Universitätsklinik
Heithofer Allee 64, 59071 Hamm

LWL
Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe

LWL

Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe

RUB

Vernetzung

Plädoyer für eine integrierte Zusammenarbeit in der Suchthilfe (Berthel, Vogel, Kläusler-Winterthur)

„Herausforderungen im Suchtbereich können nur interdisziplinär gelöst werden.“

„Eine stärkere Solidarität der Leistungserbringer untereinander ist ebenso entscheidend, wie ihre Solidarität mit ihren KlientInnen.“

Kooperation und Vernetzung

- Kooperationstreffen mit Präventions- und Suchtberatungsstellen
- Qualitätszirkel KJP-Suchtbehandlung NRW
- Mitarbeit in kommunalen Ausschüssen, Präventionsnetzwerken
- Jährliche Informationsveranstaltung für Zuweiser

LWL-Universitätsklinik Hamm der Ruhr-Universität Bochum
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie • Psychotherapie
▪ Psychosomatik im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Informationsveranstaltung

Suchttherapie mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen

21. April 2016 - 9:30 bis 16:00 Uhr

Anlaufstellen für jugendliche Drogenkonsumenten im Helfersystem

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen zum Therapieangebot in Hamm:

www.drug-out.lwl.org